

抗がん剤レジメン一覧

【乳がん】
BEV + PTX
ddEC
EC
ERI
PER + HER + DTX
TC
T-DM1
weekly PTX
HP
HP + PTX

【食道がん】
weekly PTX
FP + Pembro

【胃がん】
CPT-11
CAPOX + HER
RAM + nab-PTX
RAM + PTX
SOX + Nivo

【大腸がん】
BEV + 5FU + LV
BEV + TAS-102
FOLFIRI + BEV
FOLFIRI + CET
FOLFIRI + PANI
FOLFIRI + RAM
mFOLFOX6 + BEV
mFOLFOX6 + CET (biweekly)
mFOLFOX6 + PANI
Pembrolizumab

【肝・胆・膵がん】
<u>GC + Pembro</u>
<u>GEM</u>
<u>GEM + nab-PTX</u>
<u>mFOLFIRINOX</u>
<u>nal-IRI + 5FU + LV</u>

レジメン名		GC + Pembro		C-02-010			
癌種		胆道がん					
1クール期間		21日					
Day	投与順序	薬品名	投与量	単位	手技・ルート	投与時間	備考
1	1	ペムブロリズマブ	200	mg/body	点滴	30分	
1	2	シスプラチン	25	mg/m2	点滴	60分	short hydration
1	3	ゲムシタビン	1000	mg/m2	点滴	30分	
8	1	シスプラチン	25	mg/m2	点滴	60分	
8	2	ゲムシタビン	1000	mg/m2	点滴	30分	
		※9コース目以降					
1	1	ペムブロリズマブ	200	mg/body	点滴	30分	
1	2	ゲムシタビン	1000	mg/m2	点滴	30分	
8	1	ゲムシタビン	1000	mg/m2	点滴	30分	

[戻る](#)

レジメン名		FP + Pembro						C-07-086
癌種		食道がん						
1クール期間		21日						
Day	投与順序	薬品名	投与量	単位	手技・ルート	投与時間	備考	
1	1	ペムブロリズマブ	200	mg/body	点滴	30分		
1	2	シスプラチン	80	mg/m2	点滴	120分		
1	3	フルオロウラシル	800	mg/m2	点滴	24時間		
2	1	フルオロウラシル	800	mg/m2	点滴	24時間		
3	1	フルオロウラシル	800	mg/m2	点滴	24時間		
4	1	フルオロウラシル	800	mg/m2	点滴	24時間		
5	1	フルオロウラシル	800	mg/m2	点滴	24時間		

[←戻る](#)

レジメン名		mFOLFOX6 + CET (biweekly)				C-07-069	
癌種		大腸がん					
1クール期間		14日					
Day	投与順序	薬品名	上限値	単位	手技・ルート	投与時間	備考
1	1	セツキシマブ	500	mg/m2	点滴	120分	
1	2	レボホリナート	200	mg/m2	点滴	120分	オキサリプラチンと同時に
1	2	オキサリプラチン	85	mg/m2	点滴	120分	レボホリナートと同時に
1	3	フルオロウラシル	400	mg/m2	点滴	2-4分	
1	4	フルオロウラシル	2400	mg/m2	点滴	46時間	

[←戻る](#)

レジメン名		RAM + nab-PTX						C-02-007
癌種		胃がん						
1クール期間		28日						
Day	投与順序	薬品名	上限値	単位	手技・ルート	投与時間	備考	
1	1	ラムシルマブ	8	mg/kg	点滴	60分		
1	2	nabパクリタキセル	100	mg/m2	点滴	30分		
8	1	nabパクリタキセル	100	mg/m2	点滴	30分		
15	1	ラムシルマブ	8	mg/kg	点滴	60分		
						2回目:30分まで可		
15	2	nabパクリタキセル	100	mg/m2	点滴	30分		

[←戻る](#)

レジメン名		FOLFIRI + RAM		C-07-052			
癌種		大腸がん					
1クール期間		14日					
Day	投与順序	薬品名	投与量	単位	手技・ルート	投与時間	備考
1	1	ラムシルマブ	8	mg/kg	点滴	60分	
1	2	レボホリナート	200	mg/m2	点滴	120分	イリノテカンと同時に
1	2	イリノテカン	150	mg/m2	点滴	90分	レボホリナートと同時に
1	3	フルオロウラシル	400	mg/m2	点滴	2-4分	
1	4	フルオロウラシル	2400	mg/m2	点滴	46時間	

[←戻る](#)

レジメン名		RAM + PTX		C-07-051			
癌種		胃がん					
1クール期間		28日					
Day	投与順序	薬品名	上限値	単位	手技・ルート	投与時間	備考
1	1	ラムシルマブ	8	mg/kg	点滴	60分	
1	2	パクリタキセル	80	mg/m2	点滴	60分	
8	1	パクリタキセル	80	mg/m2	点滴	60分	
15	1	ラムシルマブ	8	mg/kg	点滴	60分	
						2回目:30分まで可	
15	2	パクリタキセル	80	mg/m2	点滴	60分	

[←戻る](#)

レジメン名		BEV + PTX						C-07-032
癌種		乳がん						
1クール期間		28日						
Day	投与順序	薬品名	投与量	単位	手技・ルート	投与時間	備考	
1	1	パクリタキセル	90	mg/m2	点滴	60分		
1	2	ベバシズマブ	10	mg/kg	点滴	30-60分 ※初回のみ90分		
8	1	パクリタキセル	90	mg/m2	点滴	60分		
15	1	パクリタキセル	90	mg/m2	点滴	60分		
15	2	ベバシズマブ	10	mg/kg	点滴	30-60分		

[←戻る](#)

レジメン名		FOLFIRI + BEV		C-07-019			
癌種		大腸がん					
1クール期間		14日					
Day	投与順序	薬品名	上限値	単位	手技・ルート	投与時間	備考
1	1	ペバシズマブ	5	mg/kg	点滴	30-60分 初回:90分	
1	2	レボホリナート	200	mg/m2	点滴	120分	イリノテカンと同時に
1	2	イリノテカン	150	mg/m2	点滴	90分	レボホリナートと同時に
1	3	フルオロウラシル	400	mg/m2	点滴	2-4分	
1	4	フルオロウラシル	2400	mg/m2	点滴	46時間	

[←戻る](#)

レジメン名		mFOLFOX6 + BEV		C-07-010			
癌種		大腸がん					
1クール期間		14日					
Day	投与順序	薬品名	投与量	単位	手技・ルート	投与時間	備考
1	1	ペバシズマブ	5	mg/kg	点滴	60分	
1	2	レボホリナート	200	mg/m2	点滴	120分	オキサリプラチンと同時に
1	2	オキサリプラチン	85	mg/m2	点滴	120分	レボホリナートと同時に
1	3	フルオロウラシル	400	mg/m2	点滴	2-4分	
1	4	フルオロウラシル	2400	mg/m2	点滴	46時間	

[←戻る](#)

